

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

CLP 17-5-73 526130

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

30 francs

N° I52 - MAI 1973

CULTURES MARAICHERES

MYTIIS DU FRAISIER - Contre cette maladie quatre fongicides sont homologués. Ce sont : le Benomyl (30 g de M.A./hl), le Dichlofluanide (125 g de M.A./hl), le Methylthiophanate (70 g de M.A./hl), et le Thirame (320 g de M.A./hl).

La législation concernant les taux des résidus tolérés et particulièrement celle de l'Allemagne Fédérale oblige, pour rester au-dessous des tolérances admises, d'interrompre les traitements au Benomyl et au Methylthiophanate au moins 15 jours avant la récolte et de respecter strictement les doses recommandées.

CULTURES FRUITIERES

OIDIUM DES ARBRES FRUITIERS - La maladie a souvent progressé sur pommier et sur abricotier, elle est également présente sur quelques variétés de pêchers.

Traiter ou retraiter en utilisant le soufre.

Les pousses oïdiées des pommiers seront éliminées avant l'exécution du traitement.

DEVELOPPEMENT DU POMMIER ET DU POIRIER - Le développement de la végétation rend nécessaire le renouvellement de la protection. Ce traitement doit être particulièrement soigné dans les régions où la floraison s'achève seulement, régions de montagne et l'ouest du département de l'Aude (zone 4).

APAIGNEES ROUGES - Ces ravageurs sont fréquemment observés en assez grand nombre :

sur pommier avec une répartition variable sur l'arbre, c'est pourquoi il est nécessaire d'établir la moyenne des formes mobiles présentes sur le feuillage avant de décider de la nécessité de traiter; cette nécessité existe lorsque plus de 30 individus actifs par feuille seront décomptés ;

sur pêcher : il n'est pas encore nécessaire d'intervenir.

PUCERONS - Eviter l'extension des foyers de pullulation en pulvérisant :

- un insecticide acaricide sur pommier;

- sur pêcher, choisir un produit aphicide à action endothérapique.

PUCERONNE ORIENTALE - Les captures se multiplient dans les divers postes de piépages contrôlés par la Station d'Avvertissements Agricoles, en particulier dans les départements du Gard et de l'Hérault. Cependant aucune urgence n'impose encore un traitement des pêchers en production; la pulvérisation d'un aphicide endothérapique préconisé contre les pucerons aura une certaine action sur les larves qui pourraient prématurément exister.

Les Ingénieurs :

P. CHRESTIAN - L.L. TROUILLON

Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 1^{er} Mai 1973 - 2450 exemplaires
Précédente publication du 27 avril.